

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Plimycol 200 mg tablete za rodnicu klotrimazol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su Plimycol tablete za rodnicu i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Plimycol tablete za rodnicu
3. Kako primjenjivati Plimycol tablete za rodnicu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Plimycol tablete za rodnicu
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Plimycol tablete za rodnicu i za što se koriste

Lijek Plimycol tablete za rodnicu pripada u ginekološke protugljivične lijekove.

Sadržava djelatnu tvar klotrimazol, lijek iz skupine protugljivičnih lijekova koji se nazivaju imidazoli.

Plimycol tablete za rodnicu koriste se u odraslih žena i adolescentica starijih od 12 godina za liječenje kandidijaze rodnice (gljivične infekcije rodnice uzrokovane gljivicama iz roda kvasnica *Candida*).

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Plimycol tablete za rodnicu

Nemojte primjenjivati Plimycol tablete za rodnicu

- ako ste alergični na klotrimazol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Plimycol tablete za rodnicu:

- ako koristite kontraceptivna sredstva od lateksa, poput kondoma i dijafragmi jer Plimycol tablete za rodnicu mogu smanjiti njihovu učinkovitost
- ako se približava vrijeme kad ćete dobiti menstruaciju; liječenje Plimycol tabletama za rodnicu mora biti završeno prije početka menstruacije
- ako se infekcija kandidom pojavila više od 2 puta u posljednjih 6 mjeseci
- ako ste Vi ili Vaš partner ikada imali spolno prenosivu bolest
- ako ste u dobi između 12 i 15 godina ili iznad 60 godina
- ako osjećate bolove u donjem dijelu trbuha ili imate bolno mokrenje
- ako imate iscjedak iz rodnice neugodnog mirisa
- ako imate sukrvavi iscjedak iz rodnice
- ako imate poremećeno ili neredovito krvarenje iz rodnice
- ako imate ikakve ranice, čireve ili mjehuriće na stidnici ili rodnici
- ako imate vrućicu ili zimicu.

Ako kod primjene lijeka dođe do nuspojava povezanih s liječenjem (crvenila, iritacije ili oticanja), morate se obratiti svom liječniku.

Djeca i adolescenti

Prije primjene lijeka u adolescentica u dobi od 12 do 15 godina potrebna je procjena liječnika kako bi se isključili drugi mogući uzroci simptoma.

Drugi lijekovi i Plimycol tablete za rodnicu

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Istodobna primjena Plimycol tableta za rodnicu i oralnog takrolimusa te sirolimusa (lijekova koji se upotrebljavaju nakon transplantacije organa) može dovesti do povišene razine takrolimusa i sirolimusa u krvi.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Podaci o primjeni klotrimazola u trudnica su ograničeni. Kao mjera predostrožnosti, savjetuje se izbjegavanje primjene klotrimazola u prvom tromjesečju trudnoće.

Dojenje

Klotrimazol i njegovi metaboliti se izlučuju u majčinom mlijeku. Dojenje se mora prekinuti tijekom primjene klotrimazola.

Plodnost

Ispitivanja o utjecaju klotrimazola na plodnost u ljudi nisu provedena, no ispitivanja u životinja nisu pokazala bilo kakav učinak lijeka na plodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima

Primjena Plimycol tablete za rodnicu ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

3. Kako primjenjivati Plimycol tablete za rodnicu

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Plimycol tablete za rodnicu namijenjene su odraslim ženama i adolescenticama starijim od 12 godina.

Način primjene

Plimycol tablete za rodnicu namijenjene su za primjenu u rodnicu.

Cijeli postupak liječenja sastoji se od primjene 1 tablete uvečer u rodnicu tijekom tri uzastopna dana. Tabletu je potrebno što je moguće dublje umetnuti u rodnicu. Najbolje je da pritom ležite na leđima s blago savijenim nogama.

Ako se ne osjećate bolje ili se osjećate lošije nakon 7 dana te u slučaju ponovnog javljanja infekcije unutar 2 mjeseca potrebno je potražiti savjet liječnika.

Liječenje se prema preporuci liječnika može ponoviti.

Tijekom liječenja Plimycol tabletama za rodnicu preporučuje se suzdržavati se od spolnih odnosa zbog moguće infekcije partnera ili ponavljanja infekcije kod Vas. Ako su kod Vašeg partnera prisutni simptomi infekcije (npr. svrbež, upala) on se također mora podvrgnuti liječenju.

Tijekom uporabe Plimycol tableta za rodnicu nemojte koristiti tampone, sredstva za ispiranje rodnice, spermicide ili druge proizvode za primjenu u rodnicu.

Primjena u djece i adolescenata

Prije primjene lijeka u adolescentica dobi od 12 do 15 godina potrebna je procjena liječnika kako bi se isključili drugi mogući uzroci simptoma.

Ako primijenite više Plimycol tableta za rodnicu nego što ste trebali

Nije zamijećen rizik od akutnog predoziranja, obzirom da nije vjerojatno da će se predoziranje (primjena na velikoj površini pri uvjetima koji pogoduju apsorpciji) javiti nakon pojedinačne primjene u rodnicu ili na kožu ili nakon nenamjernog uzimanja kroz usta. Nema posebnog protuotrova. Međutim, u slučaju nenamjernog oralnog uzimanja, rutinske mjere poput ispiranja želuca treba provesti samo ako klinički simptomi predoziranja postanu očigledni (npr. omaglica, mučnina ili povraćanje). Ako ste nenamjerno primijenili preveliku dozu Plimycol tableta za rodnicu, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste zaboravili primijeniti Plimycol tabletu za rodnicu

Ako ste uvečer zaboravili primijeniti tabletu za rodnicu, upotrijebite je sljedeće jutro, odnosno čim se sjetite. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu

Nemojte prijevremeno ili odmah po nestanku simptoma prekinuti liječenje jer gljivična infekcija neće biti izliječena te je moguća ponovna pojava bolesti. Posavjetujte se s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

U slučaju pojave sljedeće nuspojave **prestanite primjenjivati lijek i odmah zatražite liječničku pomoć:**

- alergijske reakcije (nepoznata učestalost) koje mogu uključivati koprivnjaču, svrbež, crvenilo, a u težim slučajevima oticanje lica, otežano disanje, omaglicu, generalizirani osip.

Rijetke (javljaju se u manje od 1 na 1000 osoba):

- iritacija
- pečenje
- bol na mjestu primjene

Nepoznate (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- krvarenje iz rodnice, ljuštenje spolnih organa, svrbež, crvenilo, otok, bol u zdjelici
- bol u abdomenu

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Plimycol tablete za rodnicu

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C, zaštićeno od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili blisteru iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Plimycol tablete za rodnicu sadrže

- Djelatna tvar je klotrimazol. Jedna tableta za rodnicu sadrži 200 mg klotrimazola.
- Pomoćne tvari su: laktoza hidrat; kukuruzni škrob; karmelozanatrij; želatina; glicerol; natrijev škroboglikolat, vrste A; magnezijev stearat.

Kako Plymicol tablete za rodnicu izgledaju i sadržaj pakiranja

Plimycol tablete za rodnicu su bijele tablete za rodnicu, dimenzija 23 x 13.3 mm te s jedne strane označene nazivom PLIVA.

Plimycol tablete za rodnicu su dostupne u pakiranju od 3 tablete u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana 26. ožujka 2021.